

A la suite de votre appel au SAMU – Centre 15 des Yvelines, le médecin régulateur vous adresse ce message de recommandations :

---- VOTRE ENFANT A DE LA FIEVRE ----

- Installez-le dans une pièce fraîche et aérée (entre 18 et 20°C) et évitez les pièces surchauffées
- Ne le couvrez pas trop, laissez-le en sous-vêtements
- Ne lui donnez pas de bain froid
- Donnez-lui souvent de l'eau fraîche ou une boisson qu'il aime. Un soluté de réhydratation orale peut être proposé en complément.
- Pour le soulager et diminuer la température, vous pouvez lui donner du paracétamol.
 - Pour les enfants de moins de 27kg, le paracétamol sirop peut être pris en dose-poids à l'aide d'une pipette doseuse toutes les 6 heures
 - Pour les enfants de 27 à 50 kg, nous vous recommandons la posologie de 500mg par prise, toutes les 6 heures (soit 2g maximum par jour).
 - A partir de 50 kg, la posologie est de 1g toutes les 6h (soit 4 g maximum par jour)
- Il n'est pas utile de prendre sa température plus de deux fois par jour : **ce n'est pas le degré de la fièvre qui est important mais le comportement de votre enfant**. Un enfant qui mange, boit, joue et bouge comme d'habitude est rassurant, même s'il a 40,5°C de température.
- Consultez votre médecin si la fièvre persiste au-delà de 48 heures.

RAPPELEZ LE 15 SI VOTRE ENFANT PRÉSENTE L'UN DES SIGNES SUIVANTS (persistants malgré la prise de paracétamol) :

- Comportement anormal (confusion, somnolence, difficulté à se réveiller ou, au contraire agitation inhabituelle, cris ou pleurs inconsolables)
- Perte de connaissance ou mouvements anormaux (tremblements, convulsions)
- Sueurs
- Respiration difficile ou inhabituellement bruyante, en dehors des épisodes de toux
- Peau très pâle, teint gris, lèvres bleutées
- Apparition de taches rouges ou violacées sur la peau
- Pleurs incessants non calmés dans les bras

SI SON ETAT S'AGGRAVE, AU MOINDRE DOUTE, RAPPELEZ LE 15.

Attention : ne pas répondre à ce message, il ne serait pas lu